

Fe de erratas

VOLUMEN 2 · NUMERO 1 · MARZO 1986

En el trabajo: Principios del tratamiento de la hipertensión arterial, pág. 40, donde dice:

PALABRAS CLAVE: Fiebre - etiología
Fiebre - diagnóstico

debe decir:

PALABRAS CLAVE: Hipertensión - terapia

En el trabajo: La ecografía en el diagnóstico de la colestasis, pág. 81, Tabla IV, donde dice:

	MATZEN (14)	TAYLOR (4)	BARON (13)	O'CONNOR (17)	WHEELER (16)	HAUBEK (10)	GOLDBERG (9)	N.a SERIE (9)
Precisión en la diferenciación entre colestasis intrahepática y extrahepática	90%	91%	90%	91%	78%	88%	96%	87%
Sensibilidad +	84%	88%	84%	86%	55%	87%	94%	90%
Especificidad +	100%	100%	97%	97%	93%	89%	99%	82%
Valor Predictivo Positivo +	100%	100%	97%	97%	--	89%	99%	92%
Valor Predictivo Negativo +	81%	71%	84%	86%	--	87%	93%	78%
Tasa Falsos Positivos +	0%	0%	3%	3%	7%	--	1%	18%
Tasa Falsos Negativos +	16%	12%	16%	14%	45%	--	6%	10%

Referido al diagnóstico de obstrucción subhepática

TABLA IV: Características de la ecografía en la diferenciación entre colestasis intra y extrahepáticas

debió presentarse la serie de la siguiente manera:

TABLA IV: Características de la ecografía en la diferenciación entre colestasis intra y extrahepáticas

	TABLA IV Características de la ecografía en la diferenciación entre colestasis intra y extrahepática.							
	Nuestra serie (32 casos) (%)	Goldberg (23 casos) (%)	Haubek (84 casos) (%)	Wheeler (82 casos) (%)	O'Connor (49 casos) (%)	Baron (92 casos) (%)	Taylor (275 casos) (%)	Matzen (56 casos) (%)
Precisión en la diferenciación entre colestasis intra y extrahepática	90	91	90	91	78	88	96	87
Sensibilidad*	84	88	84	86	55	87	94	90
Especificidad*	100	100	97	97	93	89	99	82
Valor Predictivo positivo*	100	100	97	97	-	89	99	92
Valor Predictivo Negativo*	81	71	84	86	-	87	93	78
Tasa Falsos Positivos*	0	0	3	3	7	-	1	18
Tasa Falsos Negativos*	16	12	16	14	45	-	6	10

(*). Referido al diagnóstico de obstrucción subhepática.